

**Потенційний врожай
стає досяжним!**



DuPont™

Аканто Плюс® 28 к.с.

Двохкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур

- Відповідає найвищим вимогам щодо фунгіцидного захисту в інтенсивних технологіях вирощування зернових, соняшнику, ріпаку та цукрового буряку
- Максимізує врожайність та покращує показники якості врожаю за рахунок захисної, лікувальної дії та вираженого фізіологічного ефекту
- Забезпечує здоровий ріст і розвиток культури, зменшує чутливість культури до стресових факторів



The miracles of science™

Діюча речовина:пікоксістробін 200 г/л, ципроконазол 80 г/л
Препаративна форма:концентрат суспензії
Клас:стробілурини + триазоли
Упаковка:5 л (4x5л)

Аканто Плюс® - фунгіцидна активність:

- Здатний ефективно захищати від збудників захворювань, що належать до 4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів), що робить цей фунгіцид невід'ємною частиною комплексної та ефективної програми захисту врожаю і його якості
- Забезпечує збереження врожаю та покращення його якості, особливо в умовах сильного розвитку захворювань

Пікоксістробін


- Унікальна діюча речовина з класу стробілуринів
- Є сильним інгібітором на ранніх стадіях циклу розвитку збудників хвороб
- Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передачу електронів у мітохондрії
- Володіє профілактичною (превентивною) та лікувальною дією
- Після проникнення (трансламінарне переміщення) системно рухається по ксилемі
- Здатний перерозподілятися та діяти завдяки паровій фазі
- Швидко проникає в рослину та метаболічно стійкий

Ципроконазол

- Належить до класу триазолів
- Є системним компонентом захисної та лікувальної (терапевтичної) дії
- Ципроконазол є інгібітором процесу деметилування
- Здатний гальмувати ріст гіфів та грибниці грибів за рахунок порушення процесу біосинтезу стеролів у клітинній мембрані
- Проявляє тривалу захисну дію (30-40 днів)



Трансламінарне проникнення



Перерозподіл у повітрі (парова фаза)



Системне переміщення в рослині



Проникність через листові пазухи


Захист зернових колосових культур

- **Аканто Плюс® 28 к.с.** відповідає високим вимогам щодо фунгіцидного захисту в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових
- Забезпечує високоефективний та довготривалий контроль захворювань, захищає як існуючі листки, так і новий приріст
- Надає ще більше можливостей для збереження врожаю та підвищення показників його якості


Рекомендації по застосуванню на пшениці

Культура	Хвороби	Норма витрати	Спосіб та час обробки	Термін очікування	Кратність обробки
Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, види іржі, гельмінтоспоріозна плямистість, жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз, фузаріоз колосу	0,5-0,75 л/га	Обприскування в період вегетації	30 днів	2

Схема захисту пшениці



Жовта іржа



Піренофороз



Септоріоз колосу



Борошниста роса



Рекомендації до застосування Аканто Плюс®

- **Аканто Плюс® 28 к.с.** високоселективний для використання на озимому та ярому ячмені (особливо пивоварному), озимій та ярій пшениці, вівсі, тритикале
- Завдяки пікоксістробіну – одному з найкращих представників стробілуринів, **Аканто Плюс® 28 к.с.** є високоефективним проти основних плямистостей ячменю (ринхоспоріозу та гельмінтоспоріозів) і проявляє профілактичну та лікувальну дію як щодо чутливих, так і резистентних рас

Рекомендації по застосуванню на ячмені

Культура	Хвороби	Норма витрати	Спосіб та час обробок	Термін очікування	Кратність обробок
Ярий ячмінь та озимий	Сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова плямистості, види іржі, борошниста роса, септоріоз	0,5-0,75 л/га	Обприскування в період вегетації	30 днів	2


Схема захисту ячменю




Ринхоспоріоз



Ринхоспоріоз



Сітчаста плямистість/Сітчастий гельмінтоспоріоз



Аканто Плюс® на соняшнику забезпечує:


- Контроль основних захворювань соняшнику
- Покращення стійкості проти полягання
- Запобігає втратам врожаю
- Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю

Рекомендації до застосування Аканто® Плюс 28 к.с. на соняшнику

Перше внесення (Т1) – в стадії 8-10 листків культури; друге внесення (Т2) – початок бутонізації-цвітіння

Культура	Хвороби	Норма витрати	Спосіб та час обробок	Термін очікування	Кратність обробок
Соняшник	Біла та сіра гниль, фомосис, фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз	0,5-1,0 л/га	Обприскування в період вегетації	30 днів	2

Схема захисту соняшнику



Фомосис



Фомоз



Альтернаріоз



Біла гниль (Sclerotinia)

Аканто Плюс® на цукрових буряках забезпечує:

- Контроль основних захворювань цукрових буряків
- Запобігає втратам врожаю
- Подовжує фотосинтетичну активність, позитивно впливає на продуктивність та якість врожаю, покращує засвоєння добрив

Рекомендації до застосування Аканто Плюс® 28 к.с. на цукрових буряках


Рекомендується 1-2 внесення залежно від прогнозу фітосанітарної ситуації

Культура	Хвороби	Норма витрати	Спосіб та час обробок	Термін очікування	Кратність обробок
Цукровий буряк	Церкоспоров, борошниста роса, пероноспоров, іржа, рамуляріоз	0,5-0,75 л/га	Обприскування в період вегетації	30 днів	2

Схема захисту цукрових буряків

T1	T2
Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га	Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га


Борошниста роса, церкоспоров, пероноспоров, іржа, рамуляріоз



Борошниста роса



Церкоспоров



Іржа



Рамуляріоз

Аканто Плюс® на ріпаку – це економічно вигідний крок, що забезпечує:

- Запобігання появі білої гнилі (склеротинії)
- Обробка проти склеротиніозу знижує ураження альтернаріозом, ботрітісом, та циліндроспоріозом
- Покращення стійкості культури проти розтріскування стручків
- Запобігання втратам врожаю
- Покращення якості/товарності врожаю
- Прибавка врожаю, що окуповується навіть за низького рівня розвитку інфекції


Рекомендації до застосування Аканто® Плюс 28 к.с. на ріпаку

Культура	Хвороби	Норма витрати	Спосіб та час обробок	Термін очікування	Кратність обробок
Ріпак озимий та ярий	Склеротиніоз (біла гниль), альтернаріоз, циліндроспоріоз, сіра гниль	0,5-1,0 л/га	1-2 обприскування в період вегетації	30 днів	2

Схема захисту ріпаку

Аканто Плюс®
1-2 обробки: 0,5-1,0 л/га

Склеротиніоз (біла гниль), альтернаріоз, циліндроспоріоз, сіра гниль



Альтернаріоз



Склеротиніоз (біла гниль)



Циліндроспоріоз