



**DuPont™**

## **Райфл® 25 в.г.**

Високоєфективний післясходовий гербіцид для контролю багаторічних та однорічних злакових і однорічних двосім'ядольних бур'янів у посівах кукурудзи

- Ефективний проти всіх злакових (мишій, види пиріїв, гумай та ін.) та більшості дводольних бур'янів (щириця звичайна, види гірчаків та ін.) в посівах кукурудзи
- Висока селективність, технологічність та широке вікно застосування (2-7 листків культури)
- Відсутність обмежень у сівозміні
- Сумісний з більшістю препаратів, тому може застосовуватися у комплексному захисті
- Зручна упаковка та точність виміру норми витрати
- Заощадження коштів на транспортування та зберігання



*The miracles of science®*

Діюча речовина: .....римсульфурон – 250 г/к  
 Препаративна форма: ..... водорозчинні гранули  
 Упаковка: ..... пластмасова банка 500 г

**Райфл® можна використовувати у посівах кукурудзи двома способами:**

- **по-перше, Райфл®** може замінити досходову і передпосівну обробки посівів кукурудзи. Післясходове застосування **Райфлу®** забезпечує ефективний контроль як багаторічних злакових бур'янів, таких як гумай, пирій повзучий, так і однорічних злакових (пласкуха звичайна, види мишію), а також широколистяних бур'янів, таких як підмаренник чіпкий, щиріця звичайна та ін.;
- **по-друге, Райфл®** успішно застосовують як допоміжний засіб після використання ґрунтових гербіцидів, якщо від такого використання не було отримано добрих результатів, що часто трапляється за дуже сухої погоди.

## Райфл® – низькі норми витрати

**Райфл®** в чистому вигляді + **ПАР Тренд® 90** можна вносити в стадії від 1-2 до 7 листків кукурудзи (див. таблицю): найбільша ефективність обробки на стадіях від 3 до 6 листків кукурудзи.

### Одноразове внесення:

**Райфл® 40-50 г/га + ПАР Тренд® 90 (0,1%) 200—300 мл/га**

Вибір норми внесення залежить від видового складу бур'янів на час використання (на полях, забур'янених пирієм повзучим та гумаєм, слід застосувати максимальну рекомендовану дозу гербіциду).

### Дворазове внесення:

1 внесення – **Райфл® 30 г/га + ПАР Тренд® 90 (0,1%)**

2 внесення (за появи другої хвилі бур'янів) – **Райфл® 20 г/га + ПАР Тренд® 90 (0,1%)**

## Терміни застосування гербіциду Райфл®

Бур'ян	Одноразове внесення (фаза розвитку бур'яну)	Дворазове внесення (фаза розвитку бур'яну)
Гумай, пирій	15–25 см (не раніше 3-х листків)	Стадія 1–3 листків, потім через 2–3 тижні
Просо, види	Стадія 1-2 листків	
Пласкуха звичайна	Стадія 1-3 листків до середини кущіння	
Мишій, види	Стадія 1-3 листків	
Інші види однорічних злакових бур'янів	До кущіння	
Двосім'ядольні бур'яни	Багаторічні – розетка, однорічні – 2-4 листки	

## Райфл® проти однорічних, багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів

### Чутливі однорічні та багаторічні злакові бур'яни і осоки

Китник мишачохвостий	Вівсюг звичайний
Пальчатка кровоспиняюча	Пласкуха звичайна
Пирій повзучий	Пажитниця багатоквіткова
Просо посівне	Тимофіївка, види
Мишій, види	Гумай (насіння і ризоми)

### Чутливі двосім'ядольні бур'яни

Щиріця волотиста	Щиріця загнута
Грицики звичайні	Падалиця соняшнику
Дворядник тонколистий	Рутка лікарська
Підмаренник чіпкий	Соняшник звичайний
Ромашка, види	М'ята польова
Переліска однорічна	Мак дикий

Жовтець, види	Редька дика
Ріпиця зморшкувата	Гірчиця польова
Зірочник середній (Мокрець)	Нетреба, види
Гірчак вузлуватий	Гірчак почечуйний
Щавель, види	Падалиця ріпаку

### Середньочутливі двосім'ядольні бур'яни

Дурман звичайний	Гірчак берізковидний
Амброзія полинолиста	Осот рожевий

### Стійкі двосім'ядольні бур'яни

Берізка польова	Хвощ польовий
Паслін чорний	Чистець болотний
Лобода біла	Лобода гібридна

## Райфл® — рекомендовані суміші

- Для підсилення дії проти видів лободи, гірчаків, осоту рожевого та жовтого, амброзії, пасльону чорного, дурману, нетреби рекомендуються бакові суміші **Райфл® 40-50 г/га** з гербіцидами Естерон 0,3-0,5 л/га, Банвел 4С 0,2-0,5 л/га, Діален Супер 0,4-0,7 л/га, Пріма 0,4-0,6 л/га, 1/2 норми гербіцидів на основі 2,4-Д та ін. у фазу 3-5 листків кукурудзи.
- Суміш **Райфл®** плюс Пріма 0,4-0,6 л/га є селективною до стадії 7 листів включно.

## Рекомендації стосовно застосування Райфлу® в умовах сухої, жаркої погоди

- збільшити норму виліву робочого розчину до 300 л/га,
- збільшити норму **ПАР Тренд® 90** до 300 мл/га,
- обприскування проводити в вечірні та нічні години,
- обов'язково додавати аміачну селітру (4-5 кг/га (фізичної ваги)), чи карбамід,
- послідовність приготування робочого розчину: першим розчиняйте **Райфл®**, потім – азотні добрива, потім – **ПАР Тренд® 90**

## Загальні рекомендації

**Завжди уважно читайте тарну етикетку та дотримуйтесь регламентів застосування продукту.**