

Пірамін® Стар

Смерч для бур'янів



 **BASF**

The Chemical Company

Пірамін® Стар

Призначений у першу чергу для повного знищення бур'яну, який важко викорінюється – підмаренника чіпкого, а також для боротьби з іншими дводольними бур'янами.

Діючі речовини:

Хлоридазон, 418 г/л

Квінмерак, 42 г/л

Препаративна форма:

Концентрат суспензії (КС)

Реєстрація в Україні:

Цукровий буряк

Пірамін® Стар діє через ґрунт, поглинаючись корінням бур'яну, при досходовому застосуванні, а також через зелені частини бур'янів при післясходовому застосуванні.

Для отримання оптимальних результатів при досходовому застосуванні ґрунт має містити достатню кількість вологи, щоб сформувався активний гербіцидний екран.

У посівах цукрового буряку Пірамін® Стар показав гарні результати в боротьбі проти таких бур'янів: тонконіг, метлюг, лобода біла, редька дика, паслін чорний, гібіскус трійчастий, гірчак перцевий, щиріця звичайна, мак самосійка, ромашка види.

Витрати робочої рідини:

200 – 400 л/га


Пірамін® Стар – вирішення проблеми підмаренника чіпкого, видів ромашки і гірчака.

Регламент застосування гербіциду Пірамін® Стар на цукровому буряку в Україні

Трикратне обприскування посівів цукрового буряку в суміші з препаратами на основі десмедіфаму та фенмедіфаму:

- 1-е **Пірамін® Стар** у дозі 2,0 л/га + Фронт'єр® Оптіма у дозі 0,8 – 1,2 л/га + гербіцид-партнер до сходів культури
- 2-е **Пірамін® Стар** у дозі 1,5 л/га + гербіцид-партнер – за появи бур'янів
- 3-є (за необхідності): **Пірамін® Стар** у дозі 2,0 л/га + гербіцид-партнер

Схема захисту цукрового буряку (система Антистрес)



Досвід використання препарату **Пірамін® Стар** у Німеччині, Польщі, Білорусії показав, що найбільша ефективність досягається при післясходовому застосуванні з препаратом-партнером.

Пірамін® Стар

- Високоєфективний за несприятливих погодних умов (весняні засухи, рясні опади та інші природні явища, що заважають застосуванню післясходових гербіцидів).
- Має контактну, системну і ґрунтову дію.
- Дуже висока універсальність застосування: до посіву, до сходів або по вегетуючих рослинах.
- Еталон біологічної і економічної ефективності при післясходовому застосуванні для боротьби з підмаренником чіпким.