



# Ровраль® Аквафло



# Захист з моменту посадки



## ► Ровраль® Аквафло




## ► Ровраль® Аквафло

### ► Переваги фунгіциду Ровраль® Аквафло:

- позитивний вплив на зберігання врожаю
- поєднання широкого спектру дії та високої ефективності
- партнер для антирезистентної стратегії

Фунгіцид контактної дії для захисту овочів від комплексу хвороб листового апарату та хвороб зберігання. Ровраль® Аквафло є відмінним партнером для фунгіцидів системної дії (Сігнум®) у програмі фунгіцидного захисту овочевих культур.

Характеристика фунгіциду Ровраль® Аквафло	
Діюча речовина	іпродіон (500 г/л)
Препаративна форма	концентрат суспензії (КС)
Спектр дії	капуста білоголова: альтернаріоз, різоктоніоз, сіра гниль цибуля ріпчаста: склеротиніоз (біла гниль), шийкова гниль
Розподіл у рослині	контактний
Норма витрати	цибуля: 0,75 – 1,0 л/га капуста: 0,75 – 1,0 л/га
Терміни застосування	в період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів
Кількість обробок	не більше 3 обробок за сезон
Упаковка	пластикові пляшки ємністю 1 л



Захист картоплі від грибних хвороб, крім застосування фунгіцидів по вегетації, вимагає обов'язкової обробки бульб перед посадкою та при закладці на зберігання. Компанія БАСФ приділяє велику увагу розробці препаратів цієї групи. Найвищу ефективність проти гнилей бульб у період проростання та при зберіганні виявляє фунгіцид Ровраль® Аквафло.

Ровраль® Аквафло може використовуватися нерозбавленим або розбавленим відповідно до системи обробки. Кількість води повинна обиратися відповідно до рекомендацій виробника обладнання та не повинна перевищувати 20 л/т посівного матеріалу. Ровраль® Аквафло сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів, за виключенням сильнолужних та висококіслотних речовин. Перед використанням сумішей рекомендується перевірити препарати на сумісність.

### ► Переваги фунгіциду Ровраль® Аквафло:

- висока біологічна ефективність проти збудників хвороб картоплі
- простота та гнучкість застосування
- можливість застосування у бакових сумішах

Для забезпечення оптимального покриття бульб робочим розчином необхідно дотримуватись наступних вимог:

1. Бульби повинні бути чистими від ґрунту.
2. Рівномірний розподіл бульб на конвеєрі.
3. Роликовий конвеєр повинен бути відкалібрований відповідно до:
  - пропускної здатності
  - розміру бульб
  - форми бульб
4. Розпилювач повинен бути відкалібрований.

Характеристика фунгіциду Ровраль® Аквафло	
Діюча речовина	іпродіон (500 г/л)
Препаративна форма	концентрат суспензії (КС)
Спектр дії	гнилі при зберіганні: фузаріоз, фомоз, а також різоктоніоз, парша, суха та мокра гнилі
Норма витрати	0,4 л/т
Витрата робочої рідини	залежить від обладнання, повинна забезпечувати повне рівномірне покриття бульб, не допускається стікання робочого розчину
Термін застосування	обробка бульб перед посадкою та перед закладкою на зберігання
Упаковка	пластикові пляшки ємністю 1 л

Порошиста парша



Срібляста парша



Чорна парша/ризоктоніоз



Фузаріоз

